

અગત્યનાહઠીલાંઅનેસમસ્યાયુક્તનીંદણોનોપરિચયતથાનિયંત્રણ

ખેતીમાંઆપણાંચારમુખ્યદુશ્મનોછે: રોગ, જીવાત, ઉંદરઅનેનીંદણ. આમાંથીરોગદ્વારા૨૬.૩૮ટકા, જીવાતદ્વારા૮.૬૮ટકા, ઉંદરદ્વારા૧૩.૮૮ટકાઅનેનીંદણદ્વારા૨૦.૧૦ટકાજેટલુંનુકસાનપાકઉત્પાદનમાંનોંધાયું છે. નીંદણોનેકારણજેદાંજેદાંપાકોમાં૧૦થી૧૦૦ટકાજેટલોઘટાડોથઈશકે છે. નીંદણએકહઠીલો, વાણનોતર્યો, બીજપાકોનીસાથેઉગતો, પાકઉત્પાદનઅનેગુણવત્તામાંઘટાડોકરનારો, ખેતીખર્ચવધારનારો, પ્રતિકૂળઆબોહવામાંપણઅડીખમટકીરહેનારોખેડૂતોનોસૌથીમોટોઅનેછુપોદુશ્મનછે.

આમતોમોટાભાગનાવર્ષાનુંનીંદણોનુંનિયંત્રણખાસઅઘડુંહોતુંનથી. પરંતુજેનીંદણોનુંનિયંત્રણકરવુંખૂબજઅઘડુંહોય, કોઈપણરીતેતેનુંનિયંત્રણથઈશકતુંહોયતેવાનીંદણોનેહઠીલાંનીંદણોકહેવાય. આવાનીંદણોનોજીવનકાળબેવર્ષથીવધારેહોઈ, તેનેકાયમીનીંદણોપણકહે છે.

ધરો, ચીઢો, બડું, નાળી, દાભખાસજોવામળતાંહઠીલાંનીંદણોછે. આસિવાયજેતેવિસ્તારપ્રમાણેજળકુંભી, ઘાબાજરીયું, ગાજરઘાસ, અમરવેલ, આગિયો, વાકુંબો, ગંધારીકુલકાકરી, જંગલીજવ, ગુલ્લીદંડા, જંગલીકસુંબી, જંગલીરીંગણી, સરનાળીતેમજઘણાંવિસ્તારમાંપરદેશનાઆયાતીહઠીલાંઆક્રમકનીંદણોપણજોવામળે છે.

સામાન્યરીતેમોટાભાગનાપાકોમાંધરોઅનેચીઢોનોપ્રશ્નત્યાપકપ્રમાણમાંજોવામળે છે. ઉપરાંતનોળી, ગાજરઘાસ, બડું, ઘાબાજરીયું, ગુલ્લીદંડા, જળકુંભી, અમરવેલ, આગિયો, ગંધારીકુલકાકરીવગેરેનોપ્રશ્નપણવિકટબનતોજાય છે. જેથીઆવાહઠીલાંનીંદણોનીજાણકારીતથાતેનાનિયંત્રણનાઉપાયોજાણવાજરૂરી છે.

૧. ધરો (ધ્રોક્કડ) (*Cynodon dactylon*)

ધરોબહુવર્ષીય, છીછરામૂળધરાવતું, એકદળીનીંદણ છે. બધીજગ્યાએ, બધીજઞ્જતુઓમાંઅનેબધાજપાકોમાંથાય છે. ખાસકરીનેગરમઅનેભેજયુક્તપરિસ્થિતિમાંવધુજુરસાદારવૃદ્ધિથાય છે. વિવિધપ્રકારનીજમીનમાંથાય છે, કાળી, ચીકણી, ફળદ્રુપઅનેભેજવાળીજમીનવધુમાફકઆવે છે. તેનુંપ્રસર્જનઅનેફેલાવોમુખ્યત્વેમૂળગાંઠતથાકટકાદ્વારાથાય છે. તેમાંબીજઉત્પાદનથાય છે, તેમજતાંપ્રસર્જનમાટેબીજનુંમહત્વનથી પિયતખેતીપાકોમાંતેમજફળપાકોનાબગીચાઓમાંધરોનોપ્રશ્નવિકટબન્યો છે.

અર્ધસૂકાંવિસ્તારમાંઉનાળામાંઉંડીખેડકરીધરોનીમૂળગાંઠોસૂર્યનાતાપમાંખુલ્લીકરવાનીરીતખૂબજઅસરકારક છે. ખુલ્લીચેલગાંઠોનેસૂકાતાં૭થી૧૪દિવસવાગે છે, ત્યારબાદબીજખેડકરવી. ખેડકરતાંપહેલાંડાલાપોન, ટીસીએ, ડાયુરોન, ગ્લાયફોસેટ, એમીટ્રોલ-ટીઅનેયુરેસીલજેવીનીંદણનાશકદવાઓથીધરોનાનિયંત્રણમાંસુધારોથાય છે. આદવાઓધરોનીમૂળગાંઠોસુધીપરિવહનથઈપહોંચતીહોવાથીલાંબાસમયસુધીઅનેસંપૂર્ણપણેનિયંત્રણથાય છે.

જોકેઆદવાઓનાવપરાશથીપાછલાપાકનીપસંદગીમર્યાદિતબને છે. ગ્લાયફોસેટઅનેએમીટ્રોલ- ટીજમીનમાંઅતિઅલ્પસમયમાટેકાર્યરતહોવાથીપાકપસંદગીવિસ્તૃતકરીશકાય. ધરોની૩-૪પાનઅવસ્થાએગ્લાયફોસેટદવા૧૨૦મીલીતથા૧૦૦થી૧૫૦ગ્રામએમોનિયમસલ્ફેટકેયુરીયા૧૦લીટરપાણીમાંઓગાળીનીંદણહોયતેટલાંભાગ માંનીંદણબરાબરભીંજતરીતેટ્રાવાણનોછંટકાવકરવો. ધનિષ્ઠખેતીપદ્ધતિમાંપેરાકવોટઅનેડાયકવોટએકદમયોગ્યદવાઓ છે. અને૧૫-૨૦દિવસમાંધરોનેસૂકવીનાખે છે.

આદવાઓબિનઅવશેષિત ઉનાળામાંખેડકરતાંપહેલાંએકઅઢવાડિયાનાગાળેબેખતઆદવાઓનોછંટકાવકરવાથીસાફપરીણામમળે છે.

બેથીત્રણવર્ષઆરીતેપ્રત્યક્તોકરવાથીધરોનાઉપદ્રવનેનબળોકરીશકાય. પરંતુભેજયુક્તતેમજધોવાણસંભવિતપરિસ્થિતિઉનાળુખેડધરોનાનિયંત્રણમાટેબહુઉપયોગીનથી.

આવાવિસ્તારમાંનીંદણનાશકદવાઓપરઆધારરાખવોપડે છે. પાકપદ્ધતિમાંપહોળાઅંતરેવવાતાંપાકોનોસમાવેશકરીવારંવારઆંતરખેડકરવી. પાકપરિચીતિમાંધરોનાગુંઠાહોયત્યાંપાકમુજબડાલાપોન, ગ્લાયફોસેટ, એમએસએમએ, ડીએસએમએ, સેથોકસીડીમવગેરેદવાઓનીમાવજતઆપવી.

૨. ચીઢો (છેવા) (*Cyperus rotundus*)

ચીઢોબહુવર્ષીય, ઉંડામૂળધરાવતું, એકદળીનીંદણ છે. બધીજગ્યાએ, બધીજઞ્જતુઓમાંઅનેબધાજપાકોમાંથાય છે, જોકેશિયાળામાંઓછીવૃદ્ધિહોય છે. બધાજપ્રકારનીજમીનમાંથાય છે, પથરાળજમીનમાંપણથાય છે. કાળી, ચીકણી, ફળદ્રુપઅનેભેજવાળીજમીનવધુમાફકઆવે છે. તેનુંપ્રસર્જનઅનેફેલાવોમુખ્યત્વેગાંઠદ્વારા૮૦-૮૫% અનેબીજદ્વારા૫-૧૦% થાય છે. જમીનમાંચીઢાનાએકછોડને૨-૭ગાંઠોનીસાંકળહોય છે.

સાનુકૂળપરિસ્થિતિમાંએકચોરસફુટવિસ્તારનીજમીનમાંચીઢાના૫૬નવાછોડઅને૨૬૦નવીગાંઠોઉત્પન્નથઈશકે છે. ચીઢાનીઅનેકપ્રજાતિઓ, તેપૈકીઆપણાંવિસ્તારમાંસાયપ્રસેટ-ડસનામનીપ્રજાતિજોવામળે છે.

ચીઢોનાપાનલીસાતેમજજડાહોવાથીદવાપાનપરટકીશકતીનહોઈ, પાનદ્વારાબરાબરશોષાતીનથી. ઉપરાંતજમીનમાંગાંઠોનીહારમાળાહોઈ, શોષાયેલદવામાંએકાદ-બેગાંઠસુધીપહોંચે છે. તેથીબાકીનીગાંઠોમાંથીનવોછોડફુટે છે. આમતોચીઢોનુંસંપૂર્ણરીતેનિયંત્રણકરવુશક્યનથી, તેમજતાંસંકલિતઉપાયોથીચીઢોનેકાબુમારાખીશકાય છે.

• ઉનાળામાંઉંડીખેડકરીસૂર્યનાસખતાપમાંજમીનતપાવવી. ગાંઠો/મૂળીયાભેગાકરીનાશકરવો. શક્યહોયતોમે-જુનમાસમાંજમીનપરપ્લાસ્ટીકઆવરણપાથરી૧૫દિવસજમીનનુંસોરકરણકરવું.

- વારંવારખેડકરીછોડનોનાશકરવો, જેથીજમીનનીઅંદરરહેલગાંઠોમાંસંગ્રહિતખોરાકખાલીથાયઅનેગાંઠોધીમેધીમેઉપરઆવે.
- ચીઢોછાંયાનેસંવેદનશીલહોઈ, છાંયાવાળાપાકોજેવકેજુવાર, તુવેર, એરંડાનુંવાવેતરકરવું.
- ચીઢોવાળીજમીનપરઘઉંનુંકુંવળપાથરવું.
- ચીઢોનીદણનીડ-૩

૪પાનઅવસ્થાએગ્લાયફોસેટ૧૨૦મીલીપ્રમાણે૧૦૦થી૧૫૦ગ્રામએમોનિયમસલ્ફેટકેયુરીયા૧૦લીટરપાણીમાંઓગાળીનીદણહોયતેટલાંભાગમાંનીદણબરાબરભીજયતેરીતેદ્રાવણનોછંટકાવકરવો. ગ્લાયફોસેટઅવણીત્મકદવાહોઈ, ઉભાપાકમાંછાંટીશકાયનહીં.

જોકેપહોળાઅંતરેવવાતાંપાકોમાંપાકપરદવાનપેડેતેરીતેનિર્દેશિત છંટકાવકરીશકાય.

- છંટકાવસમયેજમીનમાંભેજહોવોજોઈએ. છંટકાવપછીજમીનમાંરહેલગાંઠોમાંફરીપાનદેખાયત્યારેફરીછંટકાવકરવો.
- છંટકાવબાદ૨૦દિવસસુધીકોઈપેતીકાર્યકરવાનહીં.
- હાલમાંહેલોસલ્ફ્યુરોનનામનીદવાખાસચીઢોમાટેજનોંધાયેલછે.

ચીઢોનાનિયંત્રણમાટેપાકનહોયત્યારેહેલોસલ્ફ્યુરોન૬૭.૫ગ્રામપ્રતિહેકટર (૧.૮ગ્રામપ્રતિ૧૦લીટરપાણી)

પ્રમાણેનીદણહોયતેટલાંભાગમાંનીદણબરાબરભીજયતેરીતેદ્રાવણનોછંટકાવકરવો. ફરીથીઉગેલચીઢોનાછોડપર૧થી૨માસેબીજોછંટકાવકરવો. શેરડીસિવાયઉભાપાકમાંઆદવાછાંટીશકાતીનથી.

- આરીતેસતતકાળજીલેવાથીક્રમશઃ ચીઢોનેકાબુમાંલઈશકાયછે.

૩. નોળી(*Convolvulus arvensis*)

છેલ્લાંથોડાવર્ષોથીઆપણાંવિસ્તારમાંનાળીઅથવાનોળીનોપ્રજનવિકટબનતોજાયછે. નોળીએબહુવર્ષીય, ઉંડામૂળધરાવતું, વેલાવાળુ, દ્વિવદળીનીદણછે. જમીનમાંતેનામૂળ૩મીટરઉંડાઈસુધીજઈશકેછે. બાસમાસીછોડછે, જોકેદુષ્કાળનીપરિસ્થિતિમાંસુષુપ્તઅવસ્થામાંરહેછે. તેનુંપ્રસર્જનમુખ્યત્વેમૂળતેમજબીજાદ્વારાથાયછે. બીજખૂબજલાંબીસુષુપ્તઅવસ્થાધરાવેછે.

એકઋતુમાંમૂળનાકટકાદ્વારાતે૩મીટરનાઘેરાવામાંફેલાઈશકેછે. નોળીઅર્ધસૂકાંવિસ્તારમાંખેડાણુ, બગીચાતથાબિનાખેડાણુવિસ્તારમાંથાયછે. ઘઉં, કપાસ, તુવેર, દિવેલાં, બટાટાઅનેશેરડીનાપાકમાંવધારેથાયછે. વેલાવાળુનીદણહોવાથીપાકનાછોડનેબાંધતુહોઈ, પાકનીકાપણીમાંનડતરફબનેછે.

નીદણનાશકદવાથીઅથવાહાથનિંદામણુકેઆંતરખેડથીનોળીનાછોડનોનાશથઈશકેછે. પરંતુમૂળઉંડાહોઈ, તેનાકટકામાંથીફરીથીનવોછોડઉત્પન્નથાયછે. અત્યારેઆપણાંવિસ્તારમાંકપાસનુંમોટાપાયેવાવેતરથાયછે.

નોળીપણુકપાસનીજમપહોળાપાનધરાવતુંનીદણહોઈ, કોઈપણનીદણનાશકદવાખાસકરીનેર, ૪-ડીદવાછાંટીશકાતીનથી, જેનોળીમાટેઅકસરીછે. તેમછતાંસંકલિતઉપાયોથીનોળીનેકાબુમાંરાખીશકાયછે.

- ઉનાળામાંઉંડીખેડકરીસૂર્યનાસખતપાપમાંજમીનતપાવવી. મૂળીયાભેગાકરીનાશકરવો. પડતરજમીનમાંદર૧૫-૨૦દિવસેખેડકરીનોળીનાછોડનોનાશકરવો.

- ઘાસચારાનાપાકોનીફેરબદલીકરવી.
- બાજરો, મકાઈ, જુવાર, ઘઉંનુંવાવેતરકરી૩૦-૩૫દિવસેર, ૪-ડી (સોડીયમસોલ્ટ) રપગ્રામપ્રતિ૧૦લીટરપાણીમાંમેળવીછંટકાવકરવો. આજુબાજુમાંકપાસનુંવાવેતરકરેલહોયકેહવેપછીકપાસનોપાકલેવાનોહોયતોર, ૪-ડીદવાછાંટવીનહીં.

- આસિવાયમેટસલ્ફ્યુરોન, ગ્લાયફોસેટ, ડીકામ્બા, પીકલોરામ, કારકેન્ડ્રાઝોનદવાઓપણુથોડે-ઘણુઅંશેઅસરકારકછે.
- ૨, ૪-ડીનીસાથેગ્લાયફોસેટ, ડીકામ્બાકેમેટસલ્ફ્યુરોનદવામિશ્રકરીનેછાંટવાથીસાફનિયંત્રણથાયછે.

૪. ગાજરઘાસ(*Parthenium hysterophorus*)

ગાજરઘાસવર્ષીય, પ્રકાશઅનેતાપમાનઅસંવેદનશીલ, દ્વિવદળીનીદણછે. તેનુંપ્રસર્જનમુખ્યત્વેબીજથીથાયછે. એકછોડમાં૫,૦૦૦થી૧૦,૦૦૦બીજપેદાથાયછે. આસિવાયજયારેમાનુછોડથીપ્રકાંડકપાઈજાયત્યારેતેનીમુકુટકલિકામાંથીનવોછોડફુટેછે. ચોમાસામાંઉગેછેઅનેશિયાળામાંપણુવૃદ્ધિચાલુરહેછે. ઉનાળામાંવૃદ્ધિગંઠાઈજાયછે. આનીદણનોઉપદ્રવખાસકરીનેરસ્તાનીબાજુમાં, રહેણાંકકેઅન્યપડતરજમીનોમાંજોવામળેછે. પાકવિસ્તારમાંબહુઉપદ્રવહોતોનથી, પરંતુલવેઘણાંપાકમાંજોવામળેછે. તેમાંરહેલઝેરીતત્વપાર્થેનીનનેકારણેમાણુસમાંચામડીનાઅનેમાનસિકતણાવનાએલજીકરોગોથાયછે. તેનીપરાગરજખૂબજહાનિકારકહોયછે. પશુઓમાંપણુઘણાંરોગોથાયછે.

ગાજરઘાસનાનિયંત્રણમાટેસંકલિતઉપાયોકરવાપડે.

- નવાવિસ્તારમાંગાજરઘાસજોવામળેત્યારેતેનેહાથથીઉખેડવાનીઝૂંબેશકરવાનીભલામણુછે. આમાટેરવયંસેવકોએહાથમોજાપહેરવાઅનેચોકસાઈકરવંકિછોડમુકુટવિસ્તારસુધીઉખડીગયેલછે.
- ગાજરઘાસપ્રસ્થાપિતથયેલહોયતેવાવિસ્તારમાંનીદણનાકાર્થશીલવૃદ્ધિકાળદરમ્યાનર, ૪-ડી (સોડીયમસોલ્ટ) ૫૦ગ્રામપ્રતિ૧૦લીટરપાણીમાંમેળવીછોડપરછંટકાવકરવો.

- ડાયકોટાઇથવાગ્લાયફોસેટ૧.૦% (૧૦૦મી.લી. પ્રતિ૧૦લીટરપાણી)નોછંટકાવકરવાથીઅસરકારકનિયંત્રણકરીશકાયછે.
- આસિવાયમેટ્રીબ્યુઝીન૦.૫% (૫૦ગ્રામપ્રતિ૧૦લીટરપાણી) અથવામેટસલ્ફ્યુરોન૧ગ્રામપ્રતિ૧૦લીટરપાણીમાંઅથવાકલોરીમ્યુરોન૧ગ્રામપ્રતિ૧૦લીટરપાણીમાંમેળવીછંટકાવકરીશકાય.

- પાકવિસ્તારમાંજેતેપાકમાંબલામણથયેલદવાઓજેવીકેએટ્રાઝીન, સીમાઝીન, એલાકલોર, બ્યુટાકલોર, ડાયુરોન, નાઈટ્રોફેનવગેરેપાકઅનેનીદણઉગ્યાપહેલાંછાંટવાથીગાજરઘાસનુંરૂપમહિનાસુધીઅસરકારકનિયંત્રણકરીશકાયછે.
- પડતરવિસ્તારમાંઝાઈગોગ્રામાબાયકોલોરેટનામનીમેકસીકનભમરીછાંડવાથીગાજરઘાસનુંજૈવિકનિયંત્રણકરીશકાયછે.
- પડતરવિસ્તારમાંગાજરઘાસનુંપ્રતિસ્થાપનકરવાકુવાડીયો, સરખેખો, આવળ, ગલગોટાનુંવાવેતરકરવું.

૫. બરૂં(*Sorghum halepense*)

બરૂંરમીટરઉંચાઈધરાવનુંબહુવાર્ષીયુદ્ધાસછે. તેનુંપ્રસર્જનવાનસ્પતિકજડીયાથીતેમજબીજીથીથાયછે. તેનાંજડીયાંજમીનમાં૩મી. ઉંડાજઈશકેછે, જોકેસામાન્યરીતે૩૦-૩૫સે.મી. ઉંડાઈધરાવેછે. શિયાળામાંબરૂંનાછોડપરપુષ્કળપ્રમાણમાંબીજપાકેછેઅનેપવનમારફતફેલાયછે. ત્યારબાદજૂનાજડીયાંસુષુપ્તઅવસ્થામાંજાયછે. નવીફૂટઉનાળામાંદેખાયછેઅને૩-૪અઠવાડીયામાંતેમાંજડીયાંબનેછે. બરૂંખાસકરીનેમકાઈ, બાજરો, શેરડી, કપાસજેવાપાકમાંભારેકાળીતથાભેજસંગ્રહીશકેતેવીજમીનમાંજોવામળેછે.

નિયંત્રણમાટેઉનાળામાંખેડકરવી. નવીફૂટપરડાલાપોન૫-૭.૫કિ.ગ્રા. પ્રતિહેક્ટરપ્રમાણે૭-૧૦દિવસનાઅંતરેરછંટકાવકરવા. એવખતડીરૂકપ્લાઉથીખેડકાર્યબાદકપાસ, મકાઈ, સોયાબીનનુંવાવેતરકરવું, ટીસીએ૩૦કિ.ગ્રા. પ્રતિહેક્ટરછાંટવાથી૮૮% નિયંત્રણથાયછે. શેઢા-પાળાં, પડતરવિસ્તારમાંફૂલઆવેતેપહેલાંડાલાપોન, ડાયુરોન, બ્રોમાસીલકેસોડીયમકલોરેટ, ગ્લાયફોસેટ, પેરાકલોટનોછંટકાવકરવો.

૬. ઘાબાજરીયું(*Typha angustifolia*)

ઘાબાજરીયુંબહુવાર્ષીયુદ્ધાસવર્ગનુંનીદણછે, તેનાછોડ૧.૫-૨મીટરઉંચાલોયછે. પાનઅનેથડઉભાલોયછે. પાનલાંબા, ઘાટાં, ૫-૧૨મી.મી. પહોળાઅનેમધ્યશીરારહિતલોયછે. તેનુંડુંડુંબિલાડીનીપૂંછડીજેવુંલોયછે. તેનુંપ્રસર્જનવાનસ્પતિકતેમજસુક્ષ્મબીજથીથાયછે. એકડુંડામાં૧૦૦૦થી૨૦૦૦૦બીજલોયછે, જલાંબીસુષુપ્તઅવસ્થાધરાવેછે. મુખ્યત્વેકાદવ-કીચડવાળાતેમજપાણીભરાઈરહેતુંલોયતેવાવિસ્તારમાંતેમજનહેર, ધોરીયા-પાળા, પિયતતથાનિતારનીનીકોનાકઠિજોવામળેછે.

નિયંત્રણમાટેઉનાળામાંનહેર, ખેતતલાવડી, જળાશયો, વગેરેમાંથીપાણીનોનિતારકરીસૂકવવી. રાસાયણિકનિયંત્રણમાટેડાલાપોન૨% ટ્રાવલુનોછંટકાવકરવો. ડાલાપોન૧૫કિ.ગ્રા. +એમીટ્રોલ૩કિ.ગ્રા. અથવાએમીટ્રોલ૩કિ.ગ્રા. +ટીસીએ૧૦કિ.ગ્રા. પ્રતિહેક્ટરછંટકાવકરવો. ધોરીયા-પાળા, નિતારનીકોપરનીદણઉગ્યાપહેલાંસીમાઝીન, ડાયુરોન, ગ્લાયફોસેટકેપેરાકલોટનોછંટકાવકરવો.

૭. ગુલ્લીદંડા(*Phalaris minor*)

ઘઉંનાપાકમાંઆપરદેશીધુસણખોરઆક્રમકનીદણછે. પંજાબ, હરિયાણાતથાઉત્તરપ્રદેશમાંઘઉંમાંઆંતક્રમચાવીખેડૂનોનીઉંઘહરામકરીનાખેલછે. તેદેખાવમાંઘઉંતથાજવનેએકદમમળતુંઆવેછે, જેમાંએકસરખીઉંચાઈતથાસમયેબીજઆવેછે. દરેકછોડમાં૩૦૦થી૪૬૦ચમકતાંકાળાં, એકદમનાનાંચપટાંબીજઉત્પન્નથાયછે.

નિયંત્રણમાટેનીદણનાબીજમુક્તબિયારણનોઉપયોગકરવો. આમાટેઘઉંતથાજવનાબીજનેચાળવાથીગુલ્લીદંડાનાબીજઅલગકરવાં. પાકફેરબદલીકરવી, ઘઉંનાપાકનેબદલેયણાં, રાયડો, મકાઈનુંવાવેતરકરવુંજેથીઓળખીશકાયઅનેફૂલઆવેતેપહેલાંનાશથાય. પશુનાઆહારમાંઉપયોગનકરવો. અસરકારકનિયંત્રણમાટેઆઈસોપ્રોથ્યુરોન૦.૫કિ.ગ્રા./હે. (૧૦લીટરપાણીમાર૦મી.લી. દવા) પાકનીવાવણીબાદ૨૦-૨૫દિવસેછંટકાવકરવો, આદવાથીચીલ-બળેલોપણકાબુમાંલઈશકાયછે. કોરાંટઘઉંમાંરપગ્રામસલ્ફોસલ્ફ્યુરોનદવા૫૦૦લીટરપાણીમાંઓગાળીવાવણીબાદ૩૦-૩૫દિવસેછંટકાવકરવાથીગુલ્લીદંડાનુંઅસરકારકનિયંત્રણથાયછે.

૮. જળકુંભી (કાનકુંટી) (*Eichhornia crassipes*)

જળકુંભીપાણીમાંથતીઅનેતરતીબહુવાર્ષીયુપ્રકારનીવનસ્પતિછે. ૧૦-૨૦સે.મી. પહોળાપાનપાણીમાંતરતારહેછે. પ્રકાંડલાંબુ, પોચુંતથાકંદયુક્તલોયછે. પુષ્પગુચ્છમાં૩૦સે.મી.નીઉંબીલોયછે. દરેકઉંબીમાં૮-૧૫પીળારંગનાફૂલલોયછે. દરેકફૂલમાંથી૩૦૦૦થી૪૦૦૦બીજઉત્પન્નથાયછે. તેનાબીજપાણીમાંતળીયે૧૫વર્ષસુધીજીવંતઅવસ્થામાંપડીરહેછે. તેનુંવાનસ્પતિકપ્રસર્જનથાયછે. એકછોડએકવર્ષએકએકરવિસ્તારમાંઉપદ્રવિતથઈશકેછે.

નિયંત્રણમાટેપાણીકિકેનાલમાંથીઆવાછોડખેંચી, સૂકવીબાળીનાખવા. કેનાળનાપ્રવેશમાંજળીનાખવાથીજળકુંભીનુંઆગમનરોકીશકાય. પિયતકેપીવામાટેપાણીવાપરવાનુંનહોયત્યાર, ૪-ડી૧.૦કિ.ગ્રા. સફિયતવંતએકહેક્ટરેવાપરવાથીનિયંત્રણથઈશકેછે. ૨, ૪-ડીસોડીયમસોલ્ટ૨૦કિ.ગ્રા. +ગ્લાયફોસેટ૨૦.૫કિ.ગ્રા. અથવા૪-ડી (સોડીયમસોલ્ટ) ૨૦કિ.ગ્રા. +પેરાકલોટ૦.૫કિ.ગ્રા. પ્રતિહેક્ટરેવાપરવાથીપણજળકુંભીનુંનિયંત્રણથઈશકે (પિયતઅનેપીવામાટેપાણીવાપરીશકાયનહીં). જૈવિકનિયંત્રણમાટેનિયોચેટીનાઈકોનીઅનેનિયોચેટીનાબુચીનામનાકિટકોનોઉપયોગકરવામાંઆવેછે, તેનાથી૮૦-૮૫% સફળતામળીછે.

૯. અમરવેલ (નમૂળી, પીળીવેલ, અંતરવેલ, આકાશવેલ) (*Cuscuta reflexa*)

અમરવેલસંપૂર્ણપરોપજીવીઆક્રમકનીંદણુછે. વિશ્વમાંઅમરવેલનીલગભગ૧૭૦પ્રજાતિઓછે. બીજા૮-૧૦વર્ષજીવીતરહીશકેછે. બીજનાઉગાવામાટેકોઈઉત્તેજકનીજરૂરહેતીનથી. અમરવેલનાઉગતાંમૂળપાકનામૂળસાથેસીધુજોડાણુકરેછે. અમરવેલનોએકછોડરકિ.મી. સુધીલંબાઈશકેછે. રજકોમુખ્યજમાનપાકછે, ઉપરાંતબરસીમ, રામતલ, અળસી, મગ, અડદ, ચણાતેમજઘણાંવૃક્ષો, કુપોમાંપણુજોવામળેછે. તેનોફેલાવોબીજતથાટુકડાંમારફતથાયછે.

નિયંત્રણમાટેનીંદણુમુકતબીજનુંવાવેતરકરવું. શક્યહોયતોએકઓરવાણુપિયતઆપીડોગેલાંનીંદણુકરબચવાવીનાશકરવાં. એકદળીપાક (ઘઉં, બાજરો, જવ)નીફેરબદલીકરવીતથાસૂર્યમુખી, ગુવારકેશણનાપાકનુંવાવેતરકરવું. આંતરવેલગ્રસ્તનુકશાનપામેલછોડદૂરકરવાતથાતેભાગબાળીનાશકરવો. પેરાકવોટ૪૦મી.લી. દવાનું૧૦લીટરપાણીમાંદ્રાવણબનાવીરજકાનીકાપણીબાદછંટકાવકરીરદિવસપિયતઆપવુંજેથીરપર્શકદવાથીપરોપજીવીમરીજાયછે. રજકાનાપાકમાંઆંતરવેલનાનિયંત્રણમાટેપેન્ડીમેથાલીન૦.૫કિ.ગ્રા./લે. (૧૦લીટરપાણીમા૩૩મી.લી. દવા) રજકાનીવાવણીબાદ૧૦દિવસેછંટકાવકરવો. તેલીબિયાનાપાકોમાંપેન્ડીમેથાલીન૦.૮કિ.ગ્રા./લે. (૧૦લીટરપાણીમા૬૦મી.લી. દવા) વાવણીબાદપરંતુપાકઅનેનીંદણુઉગ્યાપહેલાંછંટકાવકરવો.

૧૦. આગીયો(*Striga asiatica*)

આગીયોવર્ષાયુતથાઅંશત: પરોપજીવીનીંદણુછે. તેનુંપ્રસર્જનબીજથીથાયછે. બીજનાઉગાવામાટેખાસઉત્તેજકનીજરૂરહેછે. જમીનમાં૨૦દિવસસંપૂર્ણપરોપજીવીજીવનબાદજમીનમાંથીલીલાછોડતરીકેબહારઆવેછે. જમીનમાંથીબહારઆવ્યાબાદ૩૦દિવસેઆગીયાનાછોડમાંવાખોનીસંખ્યામાંબીજઆવેછે. તેનાબીજમાટીનારજકણુજેવાખૂબજબારીકહોયછે. ફૂલનોરંગસફેદથીગુલાબીહોયછે. વિશ્વમાંઆગીયાનીરૂઝપ્રજાતિઓછે, તેપેકીનીફક્તત્રણસમસ્યાયુક્તછે. એશીયાખંડમાંરૂઝાઈગાએસીયાટીકા / લુટીયાજોવામળેછે. જુવાર, બાજરાઉપરાંતમકાઈ, શેરડી, તમાકુ, મગફળી, શકરીયાવગેરેમાંજોવામળેછે. આગીયાથીજુવાર, બાજરાનાઉત્પાદનમાં૧૫-૭૫% નોઘટાડોથાયછે.

આગીયાનાનિયંત્રણમાટેફૂલઆવ્યાપહેલાંમૂળસહિતઉખાડીનાશકરવો. જુવારનાપાકમાંવાવેતરબાદ૩૦-૪૫દિવસે, ૪-ડી (એસ્ટર) ૧.૦કિ.ગ્રા./લે. (૧૦લીટરપાણીમા૫૦મી.લી. દવા) છંટકાવકરવાથીનિયંત્રણથઈશકેછે. ૨૦% યુરીયાઅથવા૫% એમોનીયમસલ્ફેટફૂલઆવવાસમયેછંટકાવકરવાથીઆગીયોસંપૂર્ણનિયંત્રણમાંઆવેછે. જુવાર, મકાઈ, શેરડીમાંનીંદણુઉગ્યાપહેલાંદાણાંદારએટ્રાઝીન૦.૫-૧.૦કિ.ગ્રા./લે. આપવાથીઅસરકારકનિયંત્રણકરીશકાય. કપાસ, સૂર્યમુખી, મગફળી, ચોળા, દિવેલકિતુવેરજેવાપિંજરપાકોલેવાથીઆયીયાનુંપ્રમાણઘટેછે.

૧૧. ગંધારીફૂલકાકરી (લેન્ટેના) (*Lantana camara*)

ગંધારીફૂલકાકરીએબહુવાર્ષીયુ, આક્રમક, પરદેશીઆયાતીનીંદણુછે. બહુવિધરંગનાફૂલધરાવતાંઆશુપનીઆયાતસુશોભનવાડતરીકેશ્રીલંકામાંથીકરવામાંઆવેલી. પરંતુઅત્યારેતેનોફેલાવોચરીયાણુવિસ્તાર, નદીવિસ્તાર, પડતર-ખરાબાનીજમીન, શેઢા-પાળા, રસ્તા, જંગલવિસ્તાર, ઉद्याનો, પર્યટનસ્થળોતેમજપાકવિસ્તારમાંપણુથયેલછે. તેનાબીજનોફેલાવોમુખ્યત્વેપક્ષાંીઓદ્વારાથાયછે. છોડનેકાપ્યાકેબાળ્યાબાદતેનુંપુન: પ્રસર્જનમુકુટકલીકાથીથાયછે. ગંધારીફૂલકાકરીનાપાનમાંલેન્ટાડેનનામનુંઝેરીરસાયણહોયછે, જેપશુઓમાંયકૃતમાંયાંદાતેમજરક્તપ્લાઝમામફિરફારકરેછે.

તેનાનિયંત્રણમાટેકાપ્યાકેબાળ્યાબાદથતીફુટપરગ્લાયફોસેટ૦.૭૫-૧% (૧૦લીટરપાણીમાં૭૫-૧૦૦મી.લી. દવા) દ્રાવણનોછંટકાવકરવો. ગ્લાયફોસેટઅનેમેટસલ્ફ્યુરોનનામિશ્રિછંટકાવથીઅસરકારકતાવધેછે. કાપેલગંધારીફૂલકાકરીનાછોડનોઉપયોગલીલાપડવાશતરીકે, ગળતિયુખાતરબનાવવાઅનેબાથોગેસપ્લાન્ટમાંથઈશકેછે.