

❖ જુવાર(JOWAR)

જુવાર એ મૂળ આફ્રિકાનો પાક છે. દુનિયાના ઘણા દેશોમાં તેનું વાવેતર થાય છે. જેવા કે દક્ષિણ યુરોપ, યુ.એસ.એ., ઓસ્ટ્રેલિયા, ચીન, પાકિસ્તાન અને ભારત. ભારતના મહારાષ્ટ્ર, મધ્ય પ્રદેશ, આંધ્ર પ્રદેશ, તામિલનાડુ, ગુજરાત, કર્ણાટક, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા અને પંજાબ વગેરે રાજ્યોમાં જુવારના પાકનું વાવેતર થાય છે. ગુજરાત રાજ્યમાં જુવાર એ ખૂબ જ અગત્યનો દાણા તેમજ ચારા માટેનો પાક છે. ગુજરાતમાં વરસાદ આધારિત વિસ્તારમાં ૯.૧૨ લાખ હેક્ટરમાં વાવેતર થાય છે. ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં મહદઅંશે દાણા તેમજ ચારા માટે અને જ્યાં ડેરીનો વિકાસ થયો છે ત્યાં ફક્ત ચારા માટે વાવેતર થાય છે. જુવારનો પાક ૩૫૦ થી ૪૦૦ મિ.મી. વરસાદમાં ખૂબ જ સારી રીતે થઈ શકે છે. ૨૦ થી ૨૫૦ તાપમાન તેના વિકાસ માટે ખૂબ જ અનુકૂળ છે.



Tribe : Andropogoneae

સુધારેલી જાતો

એક કાપણી

સી-૧૦-૨ (છાસટીયો), એસ-૧૦૪૯ (સુઢિયુ) જીએફએસ-૩, જીએએફએસ-૧૧, પુસા ચારી-૧, હરીયાણા ચારી (જેએસ-૭૩/૫૩), એસએલ-૪૪, એમપી ચારી, પુસા ચારી-૬, એચસી-૧૩૬, જવાહર ચારી-૬, યુપી ચારી-૧ (આઈએસ ૪૭૭૬), પુસા ચારી - ૨૩, હરીયાણા ચારી-૧૭૧ (એચસી- ૧૭૧), રાજસ્થાન ચારી -૧ , રાજસ્થાન ચારી- ૨ (એસયુ-૪૫), યુપી ચારી-૨, પુસા ચારી - ૯, હરીયાણા ચારી - ૨૬૦ (એચસી-૨૬૦), એચએફએસએચ-૩, પંત ચારી-૩, પ્રોએગ્રો ચારી (એસએસજી-૯૮૮), પંત ચારી - ૪, એચસી-૩૦૮, પુસા ચારી હાઈબ્રીડ - ૧૦૬ (એચસી-૧૦૬), ગુજરાત ફોડર સોરઘમ-૪, ગુજરાત ફોડર સોરઘમ-૫, હરીયાણા જુવાર - ૫૧૩ (એસ-૫૧૩).

બે કાપણી : જીએફએસ-૪, જીએફએસ-૫, સીઓ-૨૭, ગુજરાત ફોડર સોરઘમ-(એએસ-૧૬), ગુજરાત ફોડર સોરઘમ હાઈબ્રીડ - ૧ (જીએફએસએચ-૧)

બહુ કાપણી: એમપીચારી, એસએસજી ૫૯-૩ (મેથી સુદાન), પાયોનિયર હાઈબ્રીડ, એએસ-૧૬, રૂચીરા માલડાંડી, જવાહર ચારી-૬૯, પ્રોએગ્રો ચારી (એસએસજી - ૯૮૮), પીસીએચ-૧૦૬ (હાઈબ્રીડ), પંજાબ સુડેક્ષ ચારી-૧, હરાસોના - ૮૫૫, સફેદ મોતી, પંત ચારી - ૫ (યુપીએફએસ-૩૨), સીઓએફએસ-૨૯, પુસા ચારી હાઈબ્રીડ-૧૦૯ (પીસીએચ-૧૦૯) પુસા ચારી - ૬૧૫, પંથ ચારી - ૬.

ડયુઅલ પરપઝ (ગ્રેઈન એન્ડ ફોડર)

જેએસ-૨૦, જેએસ-૨૯/૧, એસપીવી-૬૬૯, આર હાઈબ્રીડ સીએસએચ-૧૪, સીએસવી-૧૫, કે-૧૧.

વાવણી: ચોમાસામાં વાવણીલાયક વરસાદ થયા બાદ વાવણી કરવી હિતાવહ છે. મોડી વાવણી કરવામાં આવે તો ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય છે. પિયતની સગવડ હોય તો વધુ ઠંડીવાળા દિવસો સિવાય વર્ષમાં ગમે ત્યારે વાવણી કરી શકાય છે. બે હરોળ વચ્ચે ૨૫ થી ૩૦ સે.મી. અંતર રાખી વાવણી કરવી જોઈએ.

બિયારણનો દર: હેક્ટર દીઠ ૬૦ કિગ્રા. સુધારેલી જાતો માટે અને હાઈબ્રીડ માટે ૩૦ કિલો

વાવણી અંતર: બે હાર વચ્ચે ૨૫ થી ૩૦ સે.મી. ચોમાસુ જુવારના વાવેતર માટે જુન-જુલાઈના પ્રથમ વરસાદે અને ઉનાળુ જુવાર માટે માર્ચ માસના પ્રથમ કે બીજા અઠવાડિયામાં વાવણી કરવી હિતાવહ છે.

ખાતર: એક કાપણી માટે હેક્ટર દીઠ ૫૦ કિગ્રા. નાઈટ્રોજન + ૪૦ કિગ્રા. ફોસ્ફરસ બે કાપણી માટે હેક્ટર દીઠ ૭૫ કિગ્રા. નાઈટ્રોજન + ૪૦ કિગ્રા. ફોસ્ફરસ આપવો જોઈએ. જે જમીનમાં જસતનુ પ્રમાણ ઓછું (૦.૫ પીપીએમ કરતા ઓછું) હોય તેવી જમીનમાં ચોમાસુ અથવા ઉનાળુ ઘાસચારાની જુવાર વાવતા પહેલા પ્રતિ હેક્ટરે ૨૫ કિલો ઝિંક સલ્ફેટ હેક્ટરે દર ત્રીજા વર્ષે અને ૧૦ ટન છાણીયુ ખાતર દર વર્ષે આપવાથી લીલા ચારા અને સુકા ચારાનું વધુ ઉત્પાદન અને સારી ગુણવત્તા વાળો ચારો મેળવી શકાય છે.

નિંદામણ નિયંત્રણ: એક આંતરખેડ કરવી અને વાવણી બાદ ૩૦ થી ૩૫ દિવસ પછી હાથથી એક નિંદામણ કરવું.

પિયત: ચોમાસુ જુવારને પિયતની જરૂર પડતી નથી, પરંતુ ઉનાળુ જુવારને ૧૦ થી ૧૫ દિવસના ગાળે પાણી આપવું. એક કાપણી પદ્ધતિ માટે ૪ થી ૫ પિયત, જ્યારે બે કાપણી પદ્ધતિ માટે ૭ થી ૮ પિયતની જરૂર પડે છે.

કાપણી: ઘાસચારાની જુવારની કાપણી ફુલ આવતી વખતે કરવામાં આવે તો પશુને ખવડાવવામાં કોઈ હાની નથી. કારણ કે, આ વખતે એટલે કે, વાવણી કર્યા બાદ ૫૦ દિવસે હાઈડ્રોસાઈનીક એસીડ ઝેરનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે, જ્યારે ૩૦ થી ૩૫ દિવસની મુદતમાં તેનું પ્રમાણ વધુ હોય છે. એક માસની જુવારમાં આ ઝેરનું પ્રમાણ એટલું બધું હોય છે કે, ફક્ત ૪ થી ૫ કિલો લીલી જુવાર ગાય ખાય તો મૃત્યુ પામે છે.

વધુમાં ફુલ વખતે કાપણી કરવાથી લીલાચારામાંથી વધુ પોષકતત્વો પશુને મળે છે. મોડી કાપણી કરવાથી કુદ પ્રોટીનનું પ્રમાણ ઘટે છે. બે કાપણી પદ્ધતિમાં પ્રથમ કાપણી બે મહિને અને ત્યાર પછીની કાપણી ૪૫ દિવસે કરવી જોઈએ.

બીજનું પ્રાપ્તી સ્થાન: મુખ્ય ઘાસચારા સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ

ઉત્પાદન: હેક્ટર દીઠ લીલાચારાનું સરેરાશ ઉત્પાદન ૩૫૦ થી ૪૦૦ કિવન્ટલ, બે કાપણી પદ્ધતિમાં ૬૫૦ કિવન્ટલ પ્રતિ હેક્ટરે અને માલ્ટી કટમાં ૧૦૦૦ કિવન્ટલ પ્રતિ હેક્ટર જેટલું મળે છે.