

❖ શણીયાર

ગુજરાત રાજ્યમાં ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં મધ્યમ કાળી, છીછરી, પથરાળ અને ડુંગરાળ વિસ્તારની પડતર જમીનમાં કુદરતી ગૌયર વિસ્તારમાં વરસાદ ઉપર આધારીત બહુ વર્ષાયુ ઘાસ થાય છે. આવા ગૌયર વિસ્તાર પશુધનના ચરિયાણથી થતા નિભાવ માટે ઘણો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલ માલધારીઓ અને પશુપાલકો માટે પશુધનને નિભાવવા તથા દુધ અને તેનું ઉત્પાદન વધારવા ઘાંસીયા ગૌયર વિસ્તારોની સુધારણા અનિવાર્ય બની રહે છે. કુદરતી ગૌયર વિસ્તારો હાલમાં ઘણાજ ઉતરી ગયેલા અને બહુવર્ષાયુ ઘાસને બદલે મૌસમી અને ઓછા પોષક તત્વોવાળા લાપડુ/ લાપડી, માખણી, વેકરીયુ જેવા ઘાસ અને કઠોળ થતા હોય છે. જ્યારે સારા ગૌયર વિસ્તારના સુધારણા અને વિકાસ માટે બહુવર્ષાયુ ઘાસ જેવા કે ધરફ, જીંજવો, અંજન, શણીયાર વગેરે ખુબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

વરસાદ ઉપર આધારીત કુદરતી ગૌયર અથવા વીડી વિસ્તારમાં બહુવર્ષાયુ શણીયાર ઘાસની નીચે મુજબની વૈજ્ઞાનિક ખેતિ પદ્ધતિ અપનાવવાથી વધુ સારું ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે અને કુદરતી ગૌયર વિસ્તારની સુધારણા અને વિકાસ સારો થઈ શકે છે. શણીયાર ઘાસ બહુવર્ષાયુ જાતોમાં એક ઉત્તમ પ્રકારનું ઘાસ છે. જે એક થી દોઢ મીટર જેટલું ઉંચું થાય છે. તેના શુંબડા ૫૦ થી ૭૫ સે.મી. ઘેરાવાના થાય છે. આ ઘાસના પાન લાંબા, સાંકડા અને બરડ હોય છે. આ ઘાસમાં ૨૦૦ થી ૨૫૦ જેટલી દાંડીઓ (ટીલર) થાય છે. આ ઘાસમાં ૮૦% જેટલા નત્રીલ પદાર્થ અને ૫.૦% જેટલું ક્રુડ પ્રોટીન હોય છે.



સુધારેલી જાત :

ગુજરાત શણીયાર-૧ તથા સ્થાનિક જાત

ખેતિ પદ્ધતિ :

જમીન:

આ ઘાસને ડુંગરાળ અને ઢાળવાળી જમીન જમીન માફક આવે છે. મોટે ભાગે પડતર અને પથરાળ જમીનમાં ઉગે છે. પાણી ભરાતું હોય તેવા અને ભારે વરસાદ વાળા વિસ્તારમાં થતું નથી. આ ઘાસ સામાન્ય રીતે ગૌયર જમીનમાં, શેઠા પાળા ઉપર કે અન્ય પડતર જમીનમાં બિનપિયત ઘાસ તરીકે લેવામાં આવે છે.

જમીનની તૈયારી:

પડતર જમીનને હળથી ખેડી, કરબની ખેડ કરી, સમાર મારીને ઢેફા ભાંગીને સરખી કરવી. પથરાળ જમીનમાં ઉપર ઉગેલ અન્ય ઘાસ દુર કરી જમીન તૈયાર કરવી.

વાવણી :

આ ઘાસનો ઉછેર બીજ, ધરુ અથવા મુળવાળા જડિયાથી થઈ શકે છે. બીજથી વાવણી કરવાની હોય ત્યારે ચોમાસા ઋતુમાં પ્રથમ વરસાદ બાદ ૪૫ સે.મી.ના અંતરે ચાસમાં ૪ થી ૫ કિલો/હેક્ટર બિયારણનો દર રાખી બીજને ભીની માટીમાં ભેળવીને બે છોડ વચ્ચે ૪૫ સે.મી. અંતર રહે તે રીતે હાથથી એક થાણા દીઠ ૫ થી ૬ બીજ થાણવા. ધરુ ઉછેરીને વાવેતર કરવું હોય અથવા જડિયાથી વાવેતર કરવું હોય ત્યારે બે ચાસ વચ્ચે ૪૫ સે.મી.નું અંતર રાખી દરેક ચાસમાં બે છોડ વચ્ચે ૪૫ સે.મી.ના અંતરે કોદાળીથી ખાડા કરી ચોમાસુ ઋતુમાં પહેલો સારો વરસાદ થયા બાદ ચાલુ ઝરમર વરસાદ વખતે ધરુ અથવા જડિયાની રોપણી કરવી.

ખાતર:

આ ઘાસને હેક્ટર દીઠ ૪૦ કિલો નાઈટ્રોજન અને ૧૦ કિલો ફોસ્ફરસ ની જરૂરીયાત રહે છે. આ જથ્થા પૈકી ૨૦ કિલો નાઈટ્રોજન અને બધો જ ફોસ્ફરસ રોપણી વખતે આપવો. બાકી રહેતો ૨૦ કિલો નાઈટ્રોજન વાવણી બાદ ૨૫ દિવસે આપવો.

પિયત:

આ ઘાસ સામાન્ય રીતે બિનપિયત-વરસાદ આધારીત ઘાસ તરીકે લેવામાં આવે છે, તેમ છતાં ભેજની અછતના સમયે પિયતની સગવડતા હોય તો જરૂરીયાત મુજબ પિયત આપવું.

પાછલી માવજત:

જરૂરીયાત મુજબ નિંદામણ અને આંતરખેડ કરવા.

કાપણી:

સૂકુ ઘાસ મેળવવા માટે કાપણી ઓક્ટોબર માસમાં કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ ઘાસને લીલા ચારા તરીકે ખવડાવવા પ્રથમ કાપણી વાવેતર બાદ ૪૫ દિવસે કરવી. કાપણી ૪૫ દિવસે કરવાથી બીજી કાપણીમા સુકાઘાસનું ઉત્પાદન પણ સારૂ મળે છે.

૫ સે.મી. ઉંચાઈએથી કરવી.

ઉત્પાદન:

લીલાચારાનું ઉત્પાદન ૧૫૦ થી ૨૦૦ કિવન્ટલ/હેક્ટર અને સુકાચારાનું ઉત્પાદન ૩૦ થી ૪૦ કિવન્ટલ જેટલું મળે છે.

આંતરપાક અને પાક ફેરબદલી:

આ ઘાસમાં આંતરપાક તરીકે મઠ અથવા ગુવારનું વાવેતર કરવાથી વધારાનું કઠોળ વર્ગનું સૂકુ ઘાસ મેળવી શકાય છે તેમજ જમીનની ફળદ્રુપતા જળવાઈ રહે છે.